

REZIDBA VOĆAKA OSIGURAVA REDOVITU I KVALITETNU RODNOST

Edukacija u Tomici

U organizaciji Marija Lovrić predsjednika općinska organizacija HSS-a Podcrkavlje i članova OO HSS-a organizirana je u Tomici edukacija rezidbe raznih vrsta voćaka na kojoj je sudjelovao veliki broj zainteresiranih poljoprivrednika s područja općine Podcrkavlje, Garčina, Klakara, N. Gadiške i dr.

Praktični dio rezanja jabuka u voćnjaku Antuna Valić, sudionicima osnovna pravila rezidbe pokazale su Vera Novaković rukovoditeljica područnog odjela HZPSS i Marijana Milušić stručna savjetnica za zaštitu bilja.

Zašto režemo i koja su najosnovnija pravila rezidbe, zaštite i gnojidbe voćaka kažu.

Voćku režemo kako bismo osigurali redovitu i kvalitetnu rodnost, a učinak reza se pozna po rodnosti, dakle rodnost je najbolja ocjena stručnosti rezača. Rodnost se ne odnosi samo na rod u godini reza, već na rodnost u kontinuitetu kroz čitav životni vijek voćke. Dakle, osnovni cilj rezidbe je obnavljanje rodnog drveta i mladica s vegetativnim pupovima, razmještaj grana i ogranaka tako da se nesmetano osvjetljava lišće osobito na donjim dijelovima voćke te odstranjivanje onih grana čiji položaj narušava uzgojni oblik i općenito uravnoteženost voćke. Svaka voćna vrsta ima svoje specifične zahtjeve u rezidbi obzirom na podlogu i najprikladniji uzgojni oblik. Sama voćka nam govori gdje, kako i koliko treba rezati. Za uspješnu rezidbu potrebno je razlikovati cvjetne i lisne pupove. Cvjetni pupovi krupniji su i zaobljeni, a lisni su pupovi izduženi. Važno je napomenuti da osim rezidbe vrlo važnu ulogu ima pravilno tretiranje protiv uzročnika bolesti poput krastavosti jabuke, bakterijske palež, lisnih ušiju, štastih ušiju, crvenog pauka i krvave uši. Voćke je potrebno dobro okupati pripravkom koji je za svaku vrstu bolesti predviđen, a prska ih se prilikom mirnog vremena. Zimsko prskanje se obavlja od padanja lišća do početka bubrenja pupova; prska se od najviših dijelova krošnje naniže, za lijepa dana, bez oborina i vjetra; plavo prskanje obavlja se bordoškom juhom u tijeku mirovanja voćaka. Još jedan od vrlo važnih uloga rodnosti voćaka jest plodnost tla, potrebna vlaga, hranjive organske tvari. Kod hranidbe su najvažniji dušik, fosfor i kalij, kojih u tlu nema u dovoljnoj količini; voćke se gnoje organskim ostacima i mineralnim gnojivima; redovita gnojidba obavlja se dva ili tri puta u tijeku godine; sastoji se od osnovne gnojidbe i prihrane; u osnovnoj gnojidbi primjenjuje se manje dušika, a više fosfora i kalija a u prihrani se gnoji dušičnim gnojivima (proljetna gnojidba ili prvo prihranjivanje prije kretanja vegetacije; drugo prihranjivanje obavlja se iza zametanja plodova).

Predsjednik županijskog HSS-a Davor Vlaović je kazao da ovakve stručne edukacije koje se održavaju po općinskim organizacijama HSS-a pomažu svim poljoprivrednim proizvođačima, te da se u ŽO HSS-a maksimalno zalaže na organizaciji stručno osposobljenih ljudi koji pružaju edukativne savjete u svim segmentima poljoprivrede koja osigurava redovitu i kvalitetnu rodnost svih vrsta poljoprivrednih proizvoda.

A.S.